

بیمار یا همراه بیمار محترم توصیه می شود در صورت بروز هر یک از علائم زیر بعد از ترخیص به پزشک یا بیمارستان مراجعه فرمایید:

۱. بیهوشی مختصر یا طولانی
۲. مشکل بیدار ماندن که چندین ساعت پس از حادثه همچنان باقی می ماند. (خواب آلودگی)
۳. خارج شدن مایع روشن یا خون از بینی یا گوش ها
۴. ضعف عمومی
۵. کبودی پشت یک یا هر دو گوش
۶. مشکل حرف زدن مانند لکنت زبان
۷. مشکل درک سخنان دیگران
۸. مشکل حفظ تعادل یا راه رفتن
۹. تشنج (حرکات ناگهانی یا غیر قابل کنترل بدن)
۱۰. مشکل دید مانند تاری یا دوتایی دیدن
۱۱. فراموشی مثلا بخاطر نیاوردن قبل و بعد از حادثه
۱۲. سردرد که تدریجاً افزایش یابد. و سرگیجه
۱۳. تهوع و استفراغ مکرر
۱۴. اختلال حواس و خواب آلودگی گیجی. خواب آلودگی شدید. عدم آگاهی به زمان و مکان. ناتوانی در درک کلام یا مشکل حرف زدن
۱۵. داشتن مشکل تنفسی (تنفس غیر عادی. نامنظم یا با صدای غیر عادی)
۱۶. اختلالات شنوایی
۱۷. اختلالات حسی (احساس ضعف و ناتوانی در حرکت دادن دست و پا و یا احساس بی حسی و ناتوانی حرکتی در صورت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

بیمارستان پیامبر اعظم صی تشم

علائم هشدار ضربه به سر



| شناسنامه پمفلت آموزشی کد ER-4-97 | |
|----------------------------------|--|
| عنوان | علائم هشدار ضربه به سر |
| تهیه کننده | زهرا نامدار کارشناس پرستاری |
| تایید کننده | کمیته آموزش به بیمار |
| سال تهیه | ۱۳۹۷ تابستان |
| ناظر کیفی | متخصص جراحی |
| دکتر سارا اکبرنژاد | سوپروایزر آموزش به بیمار ایمریا ریحانی |

منابع: کتاب راهنما خودمراقبتی خانواده ۱ سایت وزارت بهداشت

درمان و آموزش پزشکی ۱۳۹۴

کتاب بروئر و سودارت پرستاری ۲۰۱۸ فصل ۶۳