

تعریف بیماری فاویسم:

فاویسم یک بیماری ارثی خونی می باشد که به علت کمبود یکی از آنزیم های گلوبول قرمز ایجاد می شود . بیماران در حالت عادی کاملاً طبیعی بوده و هیچگونه علامتی ندارند مگر اینکه با مواد اکسیدان (خوراکی یا استنشاقی) مواجهه پیدا کنند .

علائم بیماری:

- ✦ علائم عمومی : سردرد، تهوع، استفراغ، رنگ پریدگی، بیحالی، افزایش ضربان قلب و افزایش تعداد تنفس
- ✦ علائم اختصاصی : زردی (یرقان) پوست و مخاط و تغییر رنگ ادرار (به صورت پررنگ و رنگ چای)
- ✦ در موارد پیشرفته کاهش سطح هوشیاری و افت فشارخون نیز اتفاق می افتد.
- ✦ علائم بیماری در دوره نوزادی خود را به صورت زردی شدید یا طول کشیده دوره نوزادی نشان می دهد . بنابراین تمام نوزادان مبتلا به زردی از لحاظ این بیماری بررسی می شوند.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

بیمارستان پیامبر اعظم ص قسم



شناسنامه پمفلت آموزشی PED-9-97	
عنوان	فاویسم
تهیه کننده	ام البنین بشیرزاده
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	۱۳۹۷ پاییز
ناظر کیفی	متخصص کودکان و نوزادان
دکتر فرامرز صادقی دکتر عبدالیاسط خطیبی زاده دکتر نگین خوشبخت	سوپروایزر آموزش به بیمار ایرما ریحانی

✦ **سن:** این بیماری یک بیماری ارثی است و تا پایان عمر همراه بیمار است و همواره بیمار در معرض خطر است.

علائم هشدار

- اگر مادری هستید که به کودک تان شیر می‌دهید هرگز با قلا و آسپیرین نخورید و درمورد خوردن هر دارویی با پزشک مشورت کنید.
- فرزندتان باید از خوردن یا بوییدن باقلا به هر صورت که باشد (تازه، خشک شده، یخ زده، خام و یا پخته) خودداری کند در اوایل فصل بهار که باقلای تازه به بازار می‌آید بسیار مراقب او باشید شاید موقعیت‌هایی پیش بیاید که فرزندتان ناخواسته باقلا بخورد و هیچ اتفاقی هم نیفتد اما به این پیشامدها هرگز دل خوش نکنید خطر واکنش نامطلوب همیشه وجود دارد.
- برای گندزدایی لباس‌های او از نفتالین استفاده نکنید. مراقب باشید که حتی بوی نفتالین نیز به او نرسد.

- در اتاق یا محل زندگی او از اسپری‌های خوشبوکننده هوا یا برف شادی استفاده ننمائید.
- فرزند شما نمی‌تواند و نباید خون را به دیگران اهدا نماید.
- هر چند خطر بروز عارضه فاویسم پس از ده سالگی کاهش می‌یابد اما بهتر است همیشه مراقب وی باشید.
- توصیه می‌شود که برای فرزندان دیگر خود نیز آزمایش تشخیصی فاویسم را انجام دهید.
- با بروز کوچکترین علامت مشکوک از جمله تغییر رنگ ادرار، بروز زردی و یا بیحالی مراجعه سریع به پزشک صورت گیرد.

داروهای ذیل برای بیمار مبتلا به فاویسم خطرناک است

بروفن، ویتامین C، ویتامین K، گوتریموکسازول، آسپیرین (ASA)، نیتروفورانتوئین، نیتروفورازون، سیلور، مغزخاستات.

منبع: کتاب راهنمای خودمراقبتی خانواده‌ها سایت وزارت بهداشت