

به نام هستی بخش

بیمارستان پیامبر اعظم ص تمش

مراقبت از زخم گاز گرفتگی



گاز گرفتگی توسط انسان:

گاز گرفتگی باعث تخریب پوست و بافت های عمقی انسان شده و معمولاً توسط سگ، گربه، موش، خرگوش، حیوانات وحشی و یا انسان رخ می دهد که در اثر آن، عوامل میکروبی و بیماری زا از محل صدمه دیده وارد بدن می شوند.

برخلاف تصور مردم، زمانی که گاز گرفتگی توسط انسان صورت گرفته باشد، بیشترین احتمال عفونت وجود دارد. علت این امر، تنوع میکروب های ساکن در دهان انسان می باشد. بنابراین لازم است اقدامات درمانی مربوط به گاز گرفتگی انسان بسیار دقیق و حتماً زیر نظر پزشک صورت گیرد.

گاز گرفتگی توسط گربه:

دندانهای گربه باریک و تیز هستند که سبب انتقال میکروبیهای عفونت زا به سطوح عمقی پوست، استخوان و مفاصل میشوند.

گاز گرفتگی توسط سگ:

گازگرفتگی ناشی از سگ، بیشتر در آقایان و در اندام تحتانی اتفاق می افتد و به علت عضلات قوی در آرواره سگها زخم عمقی است و باید به دقت و سرعت اقدامات لازم در مورد آن انجام گردد.

شناسنامه پمفلت آموزشی کد ER-3-97	
عنوان	مراقبت از زخم گاز گرفتگی
تهیه کننده	زهرا نامدار کارشناس پرستاری روح انگیز دهقان کارشناس پرستاری
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	۱۳۹۷ تابستان
ناظر کیفی	متخصص جراحی
دکترسارا اکبرنژاد دکتر امیر مسعود عزیز پور	سوپروایزر آموزش به بیمار ایرما ریحانی

منابع: کتاب راهنما خودمراقبتی خانواده ۱ سایت وزارت بهداشت درمان

و آموزش پزشکی ۱۳۹۴

کتاب بروئر و سودارت پرستاری ۲۰۱۸ فصل ۴

سایت آموزش بیمارستان شهید چمران شیراز

عوارض گاز گرفتگی:

هاری یک بیماری ویروسی کشنده است و اصلی ترین راه انتقال آن از طریق گاز گرفتن است که ویروس هاری مستقر در بزاق دهان وارد بدن انسان می شود. هنگامی که ویروس وارد بدن میشود، از طریق اعصاب به مغز مهاجرت نموده و باعث التهاب مغزی و مننژیت می شود.

علائم هاری :

علائم اولیه هاری شامل سرفه، خستگی، تب، سردرد، درد و ضعف عضلانی، سوزش در محل گاز گرفتگی، کاهش اشتها، احساس تهوع ، درد عضلانی ، گلو درد و حساس شدن فرد به نور و صدا می باشد.

اقدامات درمانی اولیه در فرد دچار گاز گرفتگی:

۱- شست و شوی محل زخم با آب و صابون :محل زخم با آب و صابون به طور کامل و عمیق به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه شست و شو داده شود باید توجه داشت که با فشار آب، کف مایع صابون کامل از زخم شسته شود زیرا صابون می تواند اثر ضد عفونی کننده ها را کم کند .این عمل مهم ترین روش پیشگیری از هاری محسوب می شود.

بهترین زمان اثر بخشی شست و شوی زخم، در 3 ساعت اول پس از گاز گرفتگی است.

۲- ضد عفونی کردن زخم :زخم را بعد از شست و شو باید با عوامل ضد عفونی کننده مثل بتادین، ضد عفونی و سپس پانسمان نمود.

۳- پرهیز از بخیه زدن زخم :به علت بی هواری بودن ویروس هاری، محل زخم نباید بخیه شود زیرا محیط مناسبی جهت رشد ویروس ایجاد می گردد .در پاره ای از موارد که جراحی در صورت بوده و بخیه نزدن زخم باعث باقی ماندن جای زخم شدید شود یا مواردی که جراحی بسیار وسیع باشد به شرط انجام کلیه اقدامات درمانی اولیه، می توان محل جراحی را طبق دستور پزشک بخیه نمود.

اقدامات درمانی پیشرفته:

در مرکز درمانی حتما پزشک و پرستار باید با مرکز مبارزه با بیماری های واگیر دار جهت تزریق واکسن هاری و کزاز هماهنگی نماید.

در فردی که توسط حیوان اهلی و حیوانی که متواری شده است گزیده شده است : واکسن هاری باید در ۴ نوبت در روز اول دو عدد به صورت ۲ صفرسپس روز ۷ و ۲۱ در مراکز بهداشتی و توسط کارشناس مربوطه تزریق گردد. تزریق واکسن هاری و واکسن کزاز طبق نظر مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشتی شهرستان می باشد.

با آرزوی بهبودی بیمار دلبندتان